HOJA DE DATOS

SkinnyStix®

La mayoría de nosotros pensamos que la era de la fórmula de dieta "Super-poderosa" terminó hace unos años cuando la FDA retiró la Efedra y productos similares del mercado estadounidense debido a preocupaciones de seguridad.

Bueno, resulta que "la mayoría de nosotros" nos equivocamos. Parece que un mercado " subterraneo " Enorme de miles de millones de dólares para estos quemadores de grasa a base de estimulantes surgió incluso antes de que la tinta se secase en el decreto de la FDA.

Ahora un nuevo concepto de fórmulas para adelgazar de alta calidad, súper potentes y súper efectivas está tomando el mercado por tormenta. Limitless Worldwide ha asegurado los derechos a una de las "súper fórmulas de dieta " Conmas ampliedad de investigaciones, clínicamente validadade todos los tiempos, y la ha transformado en un polvo para pérdida de peso,elevador del estado de ánimo, aumentador de energía y fácil de tomar, Es perfecto para personas muy activas, ejecutivos de alto poder, padres ocupados, y cualquier persona tratando de perder peso en el mundo actual.
SkinnyStix de Limitless Worldwide ayuda a hacer perder paso más fácil.*
Simplemente mezcle el contenido de 1 paquete de SkinnyStix en 16 onzas de agua y beba 15 minutos antes de las comidas principales... eso es todo!

Los Paquetes de Pérdida de Peso SkinnyStix Están Formulados para Promover:
Poderoso Control del Apetito* ▪ Elevación de Ánimo* ▪ Energía* ▪ Quema de Grasa* ▪ Etamina*

LIMITLESS WORLDWIDE™

PÉRDIDA DE PESO En un ensayo doble ciego, controlado con placebo sobre el compuesto funcional clave en SkinnyStix, los sujetos perdieron un significativo 122% (frente a placebo) más que los sujetos del ensayo clínico de la combinación de dos compuestos de control de peso que se encuentran en una bien conocida ayuda para bajar de peso que solía estar en el mercado. * Y no sólo eso, perdieron este peso en ¼ del tiempo. * Por otra parte, los sujetos que continuaron tomando el compuesto SkinnyStix por un año no experimentaron rebote de aumento de peso de.*

APETITO El compuesto de pérdida de peso causó que los sujetos comiesen significativamente menos calorías y dejasen de comer antes que el placebo cuando se toma quince minutos antes de comer.*

ELEVADOR DEL ÁNIMO Un cuestionario auto-reportado de "Motivación y carga de trabajo mostró mejoras significativas en:

- Contentamiento *
- Interés en Tareas*
- Afán de hacer tareas *

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Uso en conjunto con cualquier dieta y programa de ejercicios. Los resultados individuales pueden variar.

Science... Beyond Testimonials®
Ciencias . . . más allá de los testimonios®

Introducción

Un líder probado en el mercado de la pérdida de peso, Limitless Worldwide LLC lanza ahora una nueva forma, fácil de tomar, tomar suplementos en polvo de pérdida de peso. Toda la bondad de uno de los compuestos de pérdida de peso clínicamente validados, fuertemente investigados está empacado en un fácil paquete-palo-pack. Para aquellos que tienen dificultades para tragar las píldoras de dieta y quieren aprovechar los beneficios de un suplemento de pérdida de peso real, Limitless tiene una solución en forma de la deliciosa bebida en polvo SkinnyStix®.

Pérdida de peso con SkinnyStix

En un experimento doble ciego, controlado con placebo sobre el compuesto clave en SkinnyStix, 47 sujetos con sobrepeso leve a moderadamente fueron instruidos para tomar ya sea el compuesto funcional (24 sujetos) o placebo (cápsulas de aspecto idéntico conteniendo azúcar, 23 sujetos) con un vaso de agua grande 15 minutos antes de sus comidas principales, y se les pidió tener mucho cuidado de no cambiar sus hábitos alimenticios y de ejercicio actuales. Los sujetos se pesaron al inicio y al final del ensayo de 45 días. (La diferencia de peso desde el inicio hasta el día 45 se comparó mediante la prueba de Mann-Whitney para muestras apareadas con un valor de p inferior a 0.05 para mostrar significación estadística. Veintidós sujetos continuaron la suplementación durante 12 meses; Las mediciones fueron tomadas cada mes.)

Al final de 45 días, la pérdida de peso media para el compuesto clave SkinnyStix fue de 11.2 libras (5.1 kg), mientras que el grupo placebo experimentaron una disminución de menos de una libra* (0.3 kg). La diferencia fue estadísticamente significativa entre los dos grupos (p <0.05). Un examen de los datos de cada individuo en el grupo funcional mostró que 23 de los 24 sujetos (96%) perdieron peso desde el inicio. Además, los sujetos que continuaron tomando el compuesto funcional para un total de 12 meses no experimentaron rebote de aumento de peso de y fueron capaces de mantener con éxito su pérdida de peso inicial. *

Saciedad con SkinnyStix

Recientemente, el comportamiento de alimentación y los sentimientos subjetivos de apetito y la saciedad fueron rigurosamente examinados específicamente en conjunción con un alimento a voluntad (ilimitado, "a voluntad de uno") en el compuesto funcional SkinnyStix. Este estudio aleatorizado, contra-equilibrado, dentro del sujeto, a un solo ensayo ciego, cruzado realizado en la Universidad de Liverpool involucró 58 voluntarias femeninas normales y con sobrepeso (peso = 60.16 ± 6.09 kg; IMC = 21.78 ± 1.99 kg/m2), de 21.31 ± 3.79 años de edad.

A los voluntarios se les dio una primera porción del compuesto funcional o placebo con 100 ml de agua, 15 minutos antes de un desayuno de carga fija. Esto fue seguido por una segunda porción del compuesto funcional o placebo 4 horas más tarde, y 15 minutos antes de una comida a voluntad. Las calificaciones del apetito fueron evaluadas utilizando una escala analógica visual de 100 mm (VAS) para el hambre, la saciedad, deseo de comer, el consumo prospectivo, la satisfacción, la sed y náuseas. Calificaciones se tomaron a los 9 puntos de tiempo: antes de la porción (1), pre (2) y post-fija de carga de desayuno (3), cada hora entre el desayuno y el almuerzo (4-6), antes de la porción (7), pre-(8) y después del almuerzo (9). Además, se midieron el consumo de gramo y de calorías en la comida a voluntad que constaba de doce opciones de alimentos saladas y dulces altas y bajas en grasa.

Los resultados mostraron que el compuesto SkinnyStix funcional indujo una reducción significativa en la ingesta de gramos (46.6g, 12.4%) y la ingesta de kcal (132.2 kcal, 17.6%) en la comida de prueba a voluntad en comparación con el placebo (p = 0.002 y p <0.001, respectivamente). También hubo una diferencia significativa en el tiempo necesario para consumir la comida a voluntad (p = 0.005), con una duración más corta de almuerzo con el compuesto funcional SkinnyStix (16 minutos) en comparación con placebo (19 minutos). Además, el compuesto funcional produjo una reducción significativa en la ingesta de gramos de productos dulces de alto contenido de grasa (17.6 g, 27.6%) y una reducción significativa en la ingesta en gramos de productos salados bajos en grasa (19.3 g, 13.7%) en comparación con el placebo * (p = 0.031 y p = 0.012, respectivamente).

Los principales efectos de su uso en el análisis de hambre VAS (p = 0.039) y el deseo para comer (p = 0.039) se encontraron, con menos hambre y menos deseo de comer con el compuesto funcional en comparación con el placebo. * Tendencias mostraron que el consumo prospectivo fue menor con el compuesto funcional. No se observaron efectos significativos del producto en la sed o náuseas.

Energía con SkinnyStix

Varios estudios clínicos se han realizado sobre el compuesto de energía (metilxantinas) contenido en SkinnyStix, mostrando efectos de gastos termogénicos y de energía. Ya en 1981, los investigadores estudiaron el potencial efecto térmico de consumo metilxantina en sujetos humanos. Este grupo investigó el efecto térmico en voluntarios consumiendo una dosis optimizada de metilxantina. Utilizando una cámara de respiración, los investigadores observaron un aumento significativo (p <0.001) en el gasto energético en reposo en un 21.5% en la primera hora después del consumo, en comparación con el café descafeinado.

Otros autores han visto resultados similares usando métodos de calorimetría indirecta. Un grupo de investigación observó un aumento del gasto energético en reposo significativo en ambos voluntarios delgados y con sobrepeso. Dieciocho voluntarios ingirieron la dosis de metilxantina optimizada, y su tasa metabólica en reposo se midió en las próximas 2 horas y media. La tasa metabólica aumentó significativamente y mostró significación estadística al final del período de tiempo en comparación con el control de la línea de base (p <0.02). Sin embargo, otro grupo de investigación probó la misma dosis optimizada metilxantina (así como varias concentraciones más altas) en un estudio doble ciego controlado con placebo y se observó un aumento dependiente de la dosis en gasto energético en sujetos de peso normal saludables en reposo. De hecho, la dosis optimizada aumentó el gasto de energía significativamente en comparación con placebo (p <0.05). El análisis de regresión lineal también mostró una relación lineal significativa entre la dosis metilxantina frente a la concentración plasmática metilxantina (p <0.001) y la dosis metilxantina frente a la respuesta termogénica (p = 0.006).

Conclusión

Los compuestos funcionales SkinnyStix se han demostrado clínicamente que producen pérdida de peso en personas con sobrepeso de aproximadamente 11 libras en 45 días. Estudios mecanicistas han vinculado el éxito de este producto a la supresión del apetito observada y reportada. La evidencia muestra que el compuesto clave SkinnyStix es una herramienta extremadamente valiosa para aquellos que buscan ograr la pérdida de peso r, sustancial y de largo plazo. Además, SkinnyStix contiene metilxantinas para aumentar la energía, el estado de alerta y estado de ánimo, y para ayudar a mejorar los esfuerzos de pérdida de peso. Este novedoso, delicioso producto es una herramienta poderosa para ayudar a mejorar las consecuencias perjudiciales del exceso de peso corporal. *

Información Suplementaria

Tamaño de porción: 1 Paquete (3.7 g)
Porciones por Contenedor: 20

	Amount Per Serving	% Daily Value‡
Calorías	5	
Carbohidratos Totales	1 g	<1%
Azúcares	0 g	†
Niacina (como niacinamida)	6 mg	30%
Una mezcla propietaria que contiene:	1,024 mg	
Illex paraguariensis (hoja) Extracto		†
Paullinia cupana (semilla) Extracto		†
Coffea arabica (frijol) Extracto		†
Turnera diffusa var. aphrodisiaca (hoja) Extracto		†
Stevia rebaudiana (hoja) Extracto		†
Theobroma cacao L. (semilla) Extracto		†
Oryza sativa L. (semilla) Polvo		†
Cayenne (Capsicum annuum) (fruta) Polvo		†
Chlorella vulgaris (alga) Polvo		†
Vitis vinifera (seed) Extracto		†
Vaccinium angustifolium (fruta) Polvo		†
Prunus P. cerasus (fruta) Polvo		†
Prunus domestica (fruta) Polvo		†
Rubus idaeus (fruta y semilla) Concentrado		†
Fragaria virginiana (fruta) Polvo		†
Vaccinium myrtillus (fruta) Polvo		†
Vitis vinifera (fruta) Polvo		†
Vaccinium myrtillus (fruta) Extracto		†
Vaccinium angustifolium (fruta) Extracto		†

‡ Valores diarios basados en una dieta de 2,000 calorías.
† Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: ácido cítrico, ácido málico, Sabores Naturales, dextrosa, Sucralosa, Miel en polvo, sílice, col roja en polvo (para el color).

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

SkinnyStix

INSTRUCCIONES: Mezcle el contenido de 1 paquete SkinnyStix en 16 onzas líquidas de agua y beba toda la porción 15 minutos antes de las comidas principales. No exceda de 3 SkinnyStix por día. Use en conjunto con cualquier dieta y programa de ejercicios. Los resultados individuales pueden variar.

ADVERTENCIA: No exceda la porción diaria sugerida. Este producto contiene una potente xantina (es decir, cafeína), de alrededor de 120 mg por porción. Consulte a su médico antes de usar si usted está tomando medicamentos que contienen cafeína o si usted es sensible a los estimulantes. No utilice en caso de embarazo o la lactancia. No para uso de personas menores de 18 años. Mantenga fuera del alcance de los niños. Utilice únicamente según las indicaciones. No consuma si el sello está roto.

NOTA: Limite el uso de suplementos, alimentos o bebidas que contengan cafeína, mientras que consume este producto porque demasiada cafeína puede causar nerviosismo, irritabilidad, insomnio y, ocasionalmente, latidos rápidos del corazón.
Nota para los Consumidores de Cápsulas Charge™: Las cápsulas SkinnyStix y Charge™ contienen ingredientes funcionales similares. Por lo tanto, es posible reemplazar su porción Charge con una porción de SkinnyStix, y viceversa. Sin embargo, estos productos no deben tomarse juntos al mismo tiempo.

Fabricado por: Limitless Worldwide, LLC, Salt Lake City, UT 84116, EE.UU.

Distribución internacional no está autorizado sin el consentimiento previo por escrito.

Almacenar a temperatura ambiente controlada: 15 ° a 30 ° c/59˚ a 86 ° f.

SkinnyStix®

©2014 Todos los Derechos Reservados LL14544-3